

## Liraglutid (Saxenda) vid övervikt/fetma

Översikt över studier med liraglutid vid behandling av övervikt/fetma

Studie	SCALE obesity and prediabetes [1]		SCALE diabetes [2]		SCALE maintenance [3]		SCALE sleep apnea [4]	
Studielängd	56 veckor		56 veckor		56 veckor		32 veckor	
Behandling	Saxenda	Placebo	Saxenda	Placebo	Saxenda	Placebo	Saxenda	Placebo
Antal patienter	2 437	1 225	412	211	207	206	180	179
Ålder, år (SD)	45,2 (12,1)	45,0 (12,0)	55,0 (10,8)	54,7 (9,8)	45,9 (11,9)	46,5 (11)	48,6 (9,9)	48,4 (9,5)
Andel kvinnor, %	78	78	48	54	84	79	28	28
Startvikt i kg (SD)	106,2 (21,2)	106,2 (21,7)	105,7 (21,9)	106,5 (21,3)	100,4 (20,8)	98,7 (21,2)	116,5 (23,0)	118,7 (25,4)
BMI, kg/m <sup>2</sup> , vid start (SD)	38,3 (6,4)	38,3 (6,3)	37,1 (6,5)	37,4 (7,1)	36,0 (5,9)	35,2 (5,9)	38,9 (6,4)	39,4 (7,4)
Minskning av kroppsvikten, %	8,0*	2,6	5,9**	2,0#	6,2*	0,2	5,7*	1,6
≥ 5 % viktne <span>dgång</span> , %	63*	27	50**	14#	51*	22	46*#	18#
≥ 10 % viktne <span>dgång</span> , %	33*	11	23**	4#	26*	6	22*#	2#

\*Statistisk signifikant skillnad mellan Saxenda och placebo.

#Från assessment report om Saxenda, procedure No. EMEA/H/C/003780/0000.