

Tillfällig ersättning av per oral behandling vid Parkinsons sjukdom

Denna tabell är avsedd som hjälpmedel vid omställning av per oral Parkinsonbehandling till sondadministrering.

Patienter behandlade med per orala dopaminagonister kan istället tillfälligt behandlas med rotigotinplåster (Neupro). Välj då någon av de lägre doserna (2–6 mg/24 h).

Läkemedel	Form & styrka	Produktinformation	Administreringsrekommendation	Dosändring
Madopark	Tablett 100 mg/25 mg	Benserazid+Levodopa	Kan delas. Vid behov av sondadministrering byt till Madopark Quick.	
Madopark Depot	Depotkapsel, hård 100 mg/25 mg	Benserazid+Levodopa	Ej lämplig för sondadministrering. Omställning till Madopark Quick.	Initialt samma totala dagliga dos med kortare doseringsintervall. Dosjustering kan krävas. Madopark depotkapsel har lägre biotillgänglighet än tableterna. ⁽³⁾
Madopark Quick	Tablett 100 mg/25 mg	Benserazid+Levodopa	Kan lösas upp i 1/2 glas vatten. Kan lösas upp i 10 ml vatten för administrering via 8fr NG sond. ⁽¹⁾ Vid upplösning i vatten erhålls inom några få minuter en mjölkvit dispersion. Lösningen sedimenterar snabbt och bör omröras före intag. Madopark Quick mite och Madopark Quick bör efter upplösning i vatten administreras inom 30 minuter. ⁽³⁾	
Madopark Quick mite	Tablett 50 mg/12,5 mg	Benserazid+Levodopa	Kan lösas upp i 1/2 glas vatten. Kan lösas upp i 10 ml vatten för administrering via 8fr NG sond. ⁽¹⁾ Vid upplösning i vatten erhålls inom några få minuter en mjölkvit dispersion. Lösningen sedimenterar snabbt och bör omröras före intag. Madopark Quick mite och Madopark Quick bör efter upplösning i vatten administreras inom 30 minuter. ⁽³⁾	

1. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

2. NEEMMC GUIDELINES FOR TABLET CRUSHING AND ADMINISTRATION VIA ENTERAL FEEDING TUBES, Colchester university hospital, NHS Foundation Trust, April 2011.

3. FASS. www.fass.se

Läkemedel	Form & styrka	Produktinformation	Administreringsrekommendation	Dosändring
Sinemet	Tablett 12,5 mg/50 mg och 25 mg/100 mg	Karbidopa+Levodopa	Tabletten dispergerar lätt i 10 ml vatten. Kan administreras via 8fr NG sond. Lösningen kan sedimentera snabbt. Var noga med att spola genom hela dosen.	
Sinemet Depot	Depottablett 50 mg/200 mg	Karbidopa+Levodopa	Ej lämplig för sondadministrering. Omställning till Sinemet tabletter.	Samma totala dagliga dos. Intervallet mellan doserna bör förkortas. ⁽¹⁾ Dosjustering kan krävas. Sinemet depottablett har lägre biotillgänglighet än tabletten. ⁽³⁾
Sinemet Depot mite	Depottablett 25 mg/100 mg	Karbidopa+Levodopa	Ej lämplig för sondadministrering.	Samma totala dagliga dos. Intervallet mellan doserna bör förkortas. ⁽¹⁾ Dosjustering kan krävas. Sinemet depottablett har lägre biotillgänglighet än tabletten. ⁽³⁾
Stalevo*		Entakapon+Karbidopa+ Levodopa	Ska ej krossas eller delas. Tabletten dispergerar i vatten efter 5 minuter med lätt skakning. Bildar en starkt orangefärgad lösning som kan orsaka missfärgning på kläder och hud. Kan administreras via 8fr NG sond. Lösningen smakar beskt vid oral administrering, kan blandas med fruktsaft/yoghurt för att dölja smaken. ⁽²⁾ Överväg separat förskrivning av substanserna (Comtess och Sinemet tabletter).	

* Observera att kombinationstabletter med entakapon kan innehålla **olika doser levodopa** men **samma dos entakapon**. Detta innebär att en patient som behandlas med Stalevo 150 mg kan inte ersätta detta med två tabletter Stalevo 75 mg (eftersom entakapondosen då blir dubbelt så hög).

1. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes
2. NEEMMC GUIDELINES FOR TABLET CRUSHING AND ADMINISTRATION VIA ENTERAL FEEDING TUBES, Colchester university hospital,NHS Foundation Trust, April 2011.
3. FASS. www.fass.se

Läkemedel	Form & styrka	Produktinformation	Administreringsrekommendation	Dosändring
Requip	Filmdragerad tablett 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg	Ropinirol	Tabletten dispergerar lätt i 10 ml vatten. Bildar en finfördelad lösning som kan administreras via 8fr NG sond.	
Comtess	Filmdragerad tablett 200 mg	Entakapon	Ska ej krossas eller delas. Tabletten dispergerar i vatten efter 5 minuter med lätt skakning. Bildar en starkt orangefärgad lösning som kan orsaka missfärgning på kläder och hud. Kan administreras via 8fr NG sond. ⁽¹⁾	
Requip Depot	Depottablett 2 mg, 4 mg och 8 mg	Ropinirol	Ej lämplig för sondadministrering. Omställning till Requip filmdragerad tablett.	Dosjustering krävs i enlighet med FASS.se
Sifrol, Pramipexol	Tablett 0,18 mg, 0,35 mg och 0,7 mg	Pramipexol	Kan delas. Dispergerar i vatten. Lösningen är ljuskänslig och ska administreras omedelbart. ⁽²⁾	
Sifrol Depot	Depottablett 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg och 2,1 mg	Pramipexol	Får inte delas, krossas eller tuggas. Tablett löses dock upp i vatten efter ca 5 minuter. Lösningen är ljuskänslig och ska administreras omedelbart. ⁽²⁾	

1. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

2. NEEMMC GUIDELINES FOR TABLET CRUSHING AND ADMINISTRATION VIA ENTERAL FEEDING TUBES, Colchester university hospital, NHS Foundation Trust, April 2011.

3. FASS. www.fass.se