



Polivy (polatuzumab vedotin) vid tidigare obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

NT-rådets yttrande till regionerna 2022-12-12

Rekommendation i väntan på pågående utredning

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

- att avvakta med behandling med Polivy vid tidigare obehandlat DLBCL till dess att NT-rådet har genomfört en sammanvägd bedömning av behandlingens värde utifrån den etiska plattformen för prioritering

Om läkemedlet

NT-rådet rekommenderar sedan november 2020 att Polivy kan användas i kombination med bendamustin och rituximab för behandling av vuxna patienter med relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som inte är kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation.

Polivy har även fått godkänt av EMA för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat DLBCL, i kombination med rituximab, cyklofosamid, doxorubicin och prednison (R-CHP).

Motivering

NT-rådet beslutade 2022-04-13 att Polivy omfattas av nationell samverkan vid tidigare obehandlat DLBCL. Det innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation om dess användning till regionerna. För att NT-rådet ska kunna göra en bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering behövs en hälsoekonomisk värdering. NT-rådet har beställt en sådan värdering från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Till dess att NT-rådet kan göra en sammanvägd bedömning och avge en rekommendation, rekommenderas regionerna att avvakta med införande av Polivy vid tidigare obehandlat DLBCL för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlig hantering i landet.